

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 29-3-67 629222

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 21.04.21
(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Avvertissements Agricoles d'ARRAS.
C. C. P. : LILLE 57-01-67

N° LXXVIII - MARS 1967

POIRIERS - POMMIERS

Les conditions climatiques de ce début de mois ont permis une évolution assez marquée de la végétation. La plupart des variétés précoces de poirier ont maintenant dépassé le stade C³ D et ont de ce fait bénéficié d'un premier traitement mixte Oléoparathion + Cuivre conformément à notre précédente note. Si ce n'est déjà fait, il convient d'appliquer ce premier traitement sur les autres variétés plus tardives dès que ce stade sera atteint.

En effet, en plus d'une possibilité d'évolution précoce de la Tavelure engendrée par les conidies issues des chancres de rameaux, il nous faut signaler le début des projections d'ascospores dans la nature. Ces projections d'intensité encore limitée ne sont pourtant pas à négliger dans les vergers sensibles à la Tavelure. La réceptivité des arbres est encore réduite et les risques partiels mais des contaminations sont possibles à chaque période pluvieuse.

TAVELURE DU POMMIER - Les variétés telles que Belle de Boskoop-James Grieve... ont maintenant atteint le stade C³ ou sont sur le point d'y parvenir. Elles sont justiciables d'un premier traitement antitavelure. Ce traitement sera réalisé dès maintenant. On préférera pour cette application l'emploi du Cuivre à celui des Organiques de Synthèse surtout dans les vergers très sensibles au Chancre et cela malgré les risques de brûlures. Ne pas dépasser toutefois le stade D.

Pour les variétés plus tardives et n'ayant pas dépassé le stade C² - C³, se conformer à la note précédente. Attendre une prochaine évolution.

OIDIUM DU POMMIER - Il faut entreprendre la lutte contre ce champignon de très bonne heure et de toutes façons, commencer les premiers traitements avant le stade C. Une première intervention est possible dès maintenant là où les attaques de ce champignon ont été fréquentes l'an dernier et sur les variétés au voisinage du stade C.

INFORMATIONS

OIGNONS ET POIREAUX

Cette mouche pond sur le collet de la plante, à l'aisselle des feuilles, sur les écaillures, à même le sol. Puis les jeunes asticots pénètrent dans les tissus permettant par la suite l'installation de pourritures diverses.

Le moyen de lutte le plus économique consiste à pratiquer l'enrobage à sec des semences.

Utiliser une poudre à base de l'une ou l'autre de ces matières actives :

Diethion	60 grs	de matière active	par Kgr	de semence
Carbophenothion	60 grs	"	"	"
Diazinon	40 grs	"	"	"
Tchrichlorotane	40 grs	"	"	"

Trempage des plants avant repiquage dans une bouillie renfermant 50 grs de Diethion pour 10 l. d'eau (utiliser une spécialité en poudre).

Traitement du sol avant mise en place de la culture - méthode assez coûteuse citée pour mémoire.

Tous ces traitements permettent d'envisager une protection suffisante durant trois à quatre mois.

REMARQUE - Nous ne pouvons garantir la bonne continuité des avis de traitement pour les personnes qui n'auraient pas actuellement renouvelé leur abonnement pour 1967.

Le Contrôleur chargé des Avvertissements : G. CONCE

L'Inspecteur : P. COUTURIER